


IMUPRO



ImuPro Screen proporciona un **análisis individual de 22 alimentos**. Es una forma sencilla de encontrar rápidamente y a un precio razonable si pudiera existir una alergia IgG alimentaria retardada. Sólo se entregan los resultados de laboratorio sin incluir ninguna recomendación dietética.

ImuPro Basic analiza los **90 alimentos más importantes**, como los diversos tipos de carne, vegetales, frutas, cereales, productos lácteos y huevo de gallina. Junto con un informe completo con los resultados exactos, usted recibirá guías nutricionales personales que incluyen recomendaciones individuales para la rotación de 4 días.

ImuPro Complete analiza **270 alimentos y aditivos** (incluyendo los 90 alimentos de ImuPro Basic). Su dieta puede ser cambiada de forma muy selectiva basándose en los resultados. Esto significa que usted tendrá una variedad de alternativas para la rotación de 4 días.

Con ImuPro Complete, usted recibirá un informe completo con los resultados exactos y una guía nutricional personalizada que le guiarán a través de su cambio en la dieta. El paquete de resultados también incluye recomendaciones individuales para la rotación de 4 días y un libro de recetas que está específicamente adaptado a sus necesidades personales.

Para ver qué alimentos se analizan en la prueba ImuPro, por favor visite **www.imupro.com.mx**

SÍNTOMAS DE ALERGIAS ALIMENTARIAS IgG



GASTRO-INTESTINALES

- Estreñimiento/Diarrea
- Enfermedad de Crohn
- Síndrome de intestino irritable (IBS)
- Náusea

DOLOR CRÓNICO

- Dolor de cabeza
- Migraña
- Fibromialgia

SOBRE PESO

- Problemas de peso crónicos
- Obesidad

PROBLEMAS DE LA PIEL

- Problemas de la piel como dermatitis atópica
- Eczema
- Psoriasis

ImuXPro
Right Food. Better Health.



170613_PATL_MX
copyright pictures: Bartenbach; Plainpicture ID:
p62316523f, p6417303f; Fotolia ID: #56352575

ImmunoNutrition, S.A. de C.V.

Av. Central 206 Piso 1
San Pedro de los Pinos
Mexico D.F. 01180

Phone: +52 (55) 5615 3458

info@imupro.com.mx
www.imupro.com.mx

LOS COMPONENTES BÁSICOS PARA MEJORAR SU SALUD

Copyright by R-Biopharm AG, Germany

Alergia a Alimentos IgG (Tipo III): Diagnóstico y Orientación.

imupro.com.mx

IMUPRO IgG ALERGIA ALIMENTARIA (TIPO III)



ImuPro es un concepto que combina un análisis de sangre sofisticado y confiable para las alergias alimentarias IgG con asesoría post-análisis única.

¿Qué es una alergia alimentaria IgG?

Con una alergia alimentaria IgG (también llamadas alergias a alimentos tipo III), el sistema inmune reacciona a los alérgenos alimentarios generalmente inofensivos y produce anticuerpos específicos, llamados anticuerpos IgG. Estos anticuerpos pueden causar reacciones inflamatorias que pueden provocar **diversas afecciones crónicas**. Los síntomas son retardados.

Las pruebas ImuPro están diseñadas para detectar **los niveles de anticuerpos IgG**. Con los resultados de la prueba, se puede determinar si una alergia alimentaria tardía podría ser la causa de sus afecciones crónicas.

Incluso si usted está comiendo alimentos "saludables", las alergias alimentarias (Tipo III) pueden desencadenar **inflamación de bajo grado** que subyace a muchos problemas de salud tales como:


- Migraña
- Síndrome de Intestino Irritable (IBS)
- Enfermedad de Crohn
- Sobre peso

EL CONCEPTO IMUPRO – DIAGNÓSTICO Y ORIENTACIÓN



Con ImuPro, usted puede saber si los niveles elevados de anticuerpos IgG contra alimentos específicos pueden ser la causa de ciertos síntomas.

Junto con los resultados de la prueba usted recibirá una exhaustiva guía nutricional explicando sus resultados y cómo incorporar estos dentro de su estilo de vida.



Las Guías Nutricionales Contienen 3 Componentes Importantes:

1. Fase de Eliminación

Durante la fase de eliminación, usted puede consumir todos los alimentos sin niveles elevados de anticuerpos IgG en un ciclo de **rotación de 4 días**. Esto ayuda a prevenir el desarrollo de nuevas alergias alimentarias y una mala nutrición. Todos los alimentos con altos niveles de anticuerpos IgG se evitan durante esta fase. Evitándolos, los procesos inflamatorios se pueden reducir o incluso detener.

3. Fase de Estabilización

Durante la fase de estabilización, los alimentos desencadenantes identificados en la fase de provocación deben ser evitados durante al menos un año, de modo que los anticuerpos IgG puedan degradarse y **el cuerpo se pueda recuperar**. Entonces puede comenzar otra fase de provocación. Puede haber uno o dos alimentos que va a tener que evitar permanentemente.



2. Fase de Provocación

Después de la fase de eliminación, usted comienza una **dieta de provocación**, gradualmente incluyendo uno a uno los alimentos evitados. La fase de provocación ayuda a encontrar los **alimentos desencadenantes** personales. Solamente un alimento nuevo a la vez debe ser reintroducido con el fin de averiguar si podría ser el responsable de sus malestares.

Nota: Una alergia a alimentos IgG (Tipo III) **no debe confundirse con una alergia clásica a alimentos** (Tipo I). Si usted tiene una alergia tipo I, su sistema inmunológico produce anticuerpos IgE. Estos anticuerpos provocan una reacción alérgica inmediata. Los síntomas aparecen en segundos o minutos: hinchazón severa, dificultad para respirar, salpullido, comezón y hasta un choque anafiláctico. ImuPro no detecta alergias a alimentos IgE.